

## Całka podwójna

Niech  $\overline{D} = [a; b] \times [c; d]$  – ograniczony prostokąt o bokach równoległych do osi układu współrzędnych,  $n$  – liczba naturalna.


Prostokąt  $\overline{D}$  dzielimy na  $n$  prostokątów  $\overline{D}_1, \overline{D}_2, \dots, \overline{D}_n$  o rozłącznych wnętrzach i polach  $|\overline{D}_1|, |\overline{D}_2|, \dots, |\overline{D}_n|$ . Postępujemy tak dla każdego  $n \in \mathbb{N}$ , otrzymując ciąg podziałów prostokąta  $\overline{D}$ . Rozpatrujemy tylko **normalne** ciągi podziałów tzn. takie, w których wraz ze wzrostem  $n$  długości przekątnych tworzonych prostokątów dążą do zera.

Niech  $f$  - funkcja dwóch zmiennych, ograniczona na  $\overline{D}$ .

Dla ustalonego podziału  $\overline{D}_1, \dots, \overline{D}_n$  wybieramy po jednym punkcie  $A_k$  z każdego prostokąta  $\overline{D}_k$ .

Tworzymy **sumę całkową**  $S_n$  funkcji  $f$  odpowiadającą temu wyborowi punktów:

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(A_k) \cdot |\overline{D}_k|.$$



**Uwaga 1.** Dla funkcji  $f$  przyjmującej tylko wartości nieujemne,  $S_n$  jest sumą objętości prostopadłościanów o podstawach  $\overline{D}_1, \overline{D}_2, \dots, \overline{D}_n$  i wysokościach  $f(A_1), \dots, f(A_n)$ .

Wartość  $S_n$  jest więc przybliżeniem objętości bryły ograniczonej od dołu płaszczyzną  $z = 0$ , od góry wykresem funkcji  $z = f(x, y)$  i płaszczyznami  $x = a$ ,  $x = b$ ,  $y = c$ ,  $y = d$ .


**Def. 1.** Jeżeli dla każdego normalnego ciągu podziałów prostokąta  $\overline{D}$  istnieje ta sama granica właściwa  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$  – niezależna od sposobów podziału  $\overline{D}$  i wyboru punktów  $A_k \in \overline{D}_k$ , to wartość tej granicy nazywamy **całką podwójną funkcji  $f$  po prostokącie  $\overline{D}$**  i oznaczamy

$$\iint_{\overline{D}} f(x, y) dx dy \quad \text{lub} \quad \iint_{\overline{D}} f(x, y) d\sigma. \quad (1)$$

Jeżeli całka  $\iint_{\overline{D}} f(x, y) d\sigma$  istnieje, to mówimy, że funkcja  $f$  jest **całkowalna** na prostokącie  $\overline{D}$ .

### Interpretacja geometryczna

Jeżeli funkcja  $f$  jest nieujemna i ciągła w prostokącie  $\overline{D}$ , to wartość  $\iint_{\overline{D}} f(x, y) d\sigma$  jest równa objętości bryły ograniczonej od dołu płaszczyzną  $z = 0$ , a od góry (powierzchnią) wykresem funkcji  $z = f(x, y)$  i płaszczyznami  $x = a$ ,  $x = b$ ,  $y = c$ ,  $y = d$ .



### Własności całki podwójnej na prostokącie $\overline{D} = [a; b] \times [c; d]$

**Tw. 1.** Jeżeli funkcja  $f$  jest ograniczona i ciągła w prostokącie  $\overline{D}$  z wyjątkiem, być może skończonej liczby krzywych będących wykresami funkcji jednej zmiennej, to funkcja  $f$  jest całkowalna w  $\overline{D}$ .

1. Jeżeli funkcja  $f$  jest całkowalna w prostokącie  $\overline{D}$ , to dla dowolnej stałej  $\alpha \in \mathbb{R}$

$$\iint_{\overline{D}} \alpha \cdot f(x, y) d\sigma = \alpha \cdot \iint_{\overline{D}} f(x, y) d\sigma$$

2. Jeżeli funkcje  $f$  i  $g$  są całkowalne na  $\overline{D}$ , to

$$\iint_{\overline{D}} (f(x, y) + g(x, y)) d\sigma = \iint_{\overline{D}} f(x, y) d\sigma + \iint_{\overline{D}} g(x, y) d\sigma$$

3. Jeżeli  $\overline{D}$  jest sumą dwóch prostokątów  $\overline{D}_1$  i  $\overline{D}_2$  o rozłącznych wnętrzach, zaś  $f$  jest całkowalna na  $\overline{D}$ , to jest całkowalna na każdym z tych prostokątów i

$$\iint_{\overline{D}} f(x, y) d\sigma = \iint_{\overline{D}_1} f(x, y) d\sigma + \iint_{\overline{D}_2} f(x, y) d\sigma$$

**Tw. 2. (O zamianie całki podwójnej na całkę iterowaną)**

Jeżeli funkcja  $f(x, y)$  jest ciągła na  $\overline{D} = [a; b] \times [c; d]$ , to

$$\iint_{\overline{D}} f(x, y) dx dy = \int_a^b \left( \int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left( \int_a^b f(x, y) dx \right) dy. \quad (2)$$

**Przykład 1.** Obliczyć całkę podwójną  $\iint_{\overline{D}} (xy + y^2) dx dy$  po prostokącie  $\overline{D} = [0, 3] \times [-1, 1]$ .


$$\begin{aligned} \iint_{\overline{D}} (xy + y^2) dx dy &= \int_{-1}^1 \left( \int_0^3 (xy + y^2) dx \right) dy = \int_{-1}^1 \left( \frac{x^2}{2} y + xy^2 \Big|_{x=0}^{x=3} \right) dy = \int_{-1}^1 \left( \frac{9}{2} y + 3y^2 \right) dy = \\ &= \frac{9}{2} \frac{y^2}{2} + 3 \frac{y^3}{3} \Big|_{-1}^1 = \frac{9}{4} - \frac{9}{4} + 1 - (-1) = 2 \end{aligned}$$

**Uwaga 2:** Jeśli  $f(x, y) = g(x) \cdot h(y)$ , to całkę podwójną funkcji  $f(x, y)$  po prostokącie  $\overline{D} = [a; b] \times [c; d]$  można obliczyć jako iloczyn odpowiednich całek pojedynczych.

$$\iint_{\overline{D}} f(x, y) dx dy = \int_a^b g(x) dx \cdot \int_c^d h(y) dy.$$


**Def. 2.** Obszarem **normalnym względem osi OX** nazywamy obszar domknięty

$\overline{D} = \{(x, y) : a \leq x \leq b, f_1(x) \leq y \leq f_2(x), a, b \in \mathbb{R}, f_1, f_2 - \text{ciągłe w } [a; b]\}$ .



**Def. 3.** Obszarem **normalnym względem osi OY** nazywamy obszar domknięty

$$\bar{D} = \{(x, y) : c \leq y \leq d, g_1(y) \leq x \leq g_2(y), c, d \in \mathbb{R}, g_1, g_2 - \text{ciągłe w } [c; d]\}.$$



**Def. 4.** Obszarem **regularnym** nazywamy taki obszar domknięty, który jest sumą skończonej liczby obszarów normalnych nie mających wspólnych punktów wewnętrznych.

**Tw. 3.** Jeżeli funkcja  $f$  jest ciągła w obszarze normalnym

$$\bar{D} = \{(x, y) : a \leq x \leq b, f_1(x) \leq y \leq f_2(x), a, b \in \mathbb{R}, f_1, f_2 - \text{ciągłe w } [a; b]\},$$

to jest całkowna w tym obszarze i 
$$\iint_{\bar{D}} f(x, y) dx dy = \int_a^b \left( \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} f(x, y) dy \right) dx.$$

**Tw. 4.** Jeżeli funkcja  $f$  jest ciągła w obszarze normalnym

$$\bar{D} = \{(x, y) : c \leq y \leq d, g_1(y) \leq x \leq g_2(y), c, d \in \mathbb{R}, g_1, g_2 - \text{ciągłe w } [c; d]\},$$


to jest całkowna w tym obszarze i 
$$\iint_{\bar{D}} f(x, y) dx dy = \int_c^d \left( \int_{g_1(y)}^{g_2(y)} f(x, y) dx \right) dy.$$

**Przykład 2.** Obliczyć całkę  $\iint_{\bar{D}} \sin(x+y) dx dy$  po trójkącie  $\bar{D} = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0, x+y \leq \pi\}$ .

Trójkąt  $\bar{D}$  jest obszarem normalnym względem osi OX oraz względem osi OY.

Do obliczeń wykorzystamy Tw. 3.


$$\bar{D} = \{(x, y) : 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi - x\}$$



$$\begin{aligned} \iint_{\bar{D}} \sin(x+y) dx dy &= \int_0^{\pi} \left( \int_0^{\pi-x} \sin(x+y) dy \right) dx = \int_0^{\pi} \left( -\cos(x+y) \Big|_0^{\pi-x} \right) dx = \\ &= \int_0^{\pi} (-\cos \pi + \cos x) dx = \int_0^{\pi} (1 + \cos x) dx = x + \sin x \Big|_0^{\pi} = \pi. \end{aligned}$$

**Uwaga 3.** Całkę podwójną funkcji ciągłej w obszarze regularnym  $\bar{D}_1 \cup \bar{D}_2 \cup \dots \cup \bar{D}_n$  określamy jako sumę całek w obszarach normalnych  $\bar{D}_1, \bar{D}_2, \dots, \bar{D}_n$ .

**Przykład 3.** Wyrazić za pomocą całek iterowanych całkę  $\iint_{\bar{T}} f(x, y) dx dy$  po trapezie  $T$  o wierzchołkach:  $A = (0, 0)$ ,  $B = (2, 0)$ ,  $C = (2, 1)$ ,  $D = (1, 1)$ .




$$\iint_{\bar{T}} f(x, y) dx dy = \iint_{\bar{D}_1} f(x, y) dx dy + \iint_{\bar{D}_2} f(x, y) dx dy = \int_0^1 \left( \int_0^x f(x, y) dy \right) dx + \int_1^2 \left( \int_0^1 f(x, y) dy \right) dx$$

Można też wykorzystać Tw. 4, bo  $T = \{(x, y) : y \in [0, 1], y \leq x \leq 2\}$ .

$$\iint_{\bar{T}} f(x, y) dx dy = \int_0^1 \left( \int_y^2 f(x, y) dx \right) dy.$$

**Przykład 4.** Obliczyć całkę  $\iint_{\bar{D}} (x + |y - x|) dx dy$  po prostokącie  $\bar{D} = [0, 4] \times [0, 3]$ .




$$f(x, y) = x + |y - x| = \begin{cases} x + y - x = y, & \text{gdy } y \geq x; \\ x - (y - x) = 2x - y, & \text{gdy } y < x. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \iint_{\bar{D}} (x + |y - x|) dx dy &= \iint_{\bar{D}_1} y dx dy + \iint_{\bar{D}_2} (2x - y) dx dy = \int_0^3 \left( \int_0^y y dx \right) dy + \int_0^3 \left( \int_y^4 (2x - y) dx \right) dy = \\ &= \int_0^3 \left( xy \Big|_{x=0}^{x=y} \right) dy + \int_0^3 \left( x^2 - yx \Big|_{x=y}^{x=4} \right) dy = \int_0^3 y^2 dy + \int_0^3 (16 - 4y - y^2 + y^2) dy = 39. \end{aligned}$$

### Interpretacja geometryczna całki podwójnej po obszarze


Jeżeli funkcja  $f$  jest nieujemna i ciągła w obszarze regularnym  $\bar{D}$ , to wartość całki  $\iint_{\bar{D}} f(x, y) dx dy$  jest równa objętości bryły o podstawie  $\bar{D}$ , ograniczonej od góry powierzchnią  $z = f(x, y)$  oraz powierzchnią walcową utworzoną z prostych równoległych do osi  $OZ$  i przechodzących przez brzeg obszaru  $\bar{D}$ .



W szczególności pole obszaru  $\bar{D}$  jest równe całce  $\iint_{\bar{D}} 1 dx dy$ .

**Przykład 5.** Obliczyć pole obszaru  $\bar{D}$  ograniczonego krzywymi  $y = x - 1$ ,  $y^2 = x + 1$ .

Pole obliczymy jako całkę  $P = \iint_{\bar{D}} 1 dx dy$ .



Wyznaczamy punkty przecięcia krzywych ograniczających obszar.

$$\begin{cases} y = x - 1 \\ y^2 = x + 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = x - 1 \\ (x - 1)^2 = x + 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = -1 \end{cases} \vee \begin{cases} x = 3 \\ y = 2 \end{cases}$$

Najwygodniej będzie potraktować obszar  $\bar{D}$  jako obszar normalny względem osi OY.

$$\bar{D} = \{(x, y) : y \in [-1, 2], y^2 - 1 \leq x \leq y + 1\}$$

$$P = \iint_{\bar{D}} 1 dx dy = \int_{-1}^2 \left( \int_{y^2-1}^{y+1} 1 dx \right) dy = \int_{-1}^2 \left( x \Big|_{y^2-1}^{y+1} \right) dy = \int_{-1}^2 (y + 1 - y^2 + 1) dy = 2y + \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3} \Big|_{-1}^2 = \frac{9}{2}.$$


**Przykład 6a.** Obliczyć pole obszaru ograniczonego krzywymi

$y = x$ ,  $y = 2x$ ,  $y = \frac{1}{x}$ ,  $y = \frac{2}{x}$  i zawierającego punkt  $(1, 1\frac{1}{2})$ .

Wyznaczamy punkty przecięcia krzywych.

$$\begin{cases} y = x \\ y = \frac{1}{x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases}, \quad \begin{cases} y = x \\ y = \frac{2}{x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \sqrt{2} \\ y = \sqrt{2} \end{cases}, \quad \begin{cases} y = 2x \\ y = \frac{1}{x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{2}} \\ y = \sqrt{2} \end{cases}, \quad \begin{cases} y = 2x \\ y = \frac{2}{x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \end{cases}$$

Pole obliczymy jako sumę pól obszarów normalnych  $D_1$  i  $D_2$ .



$$\begin{aligned}
 \text{Pole} &= \iint_{\overline{D}_1} 1 dx dy + \iint_{\overline{D}_2} 1 dx dy = \int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1 \left( \int_{\frac{1}{x}}^{2x} dy \right) dx + \int_1^{\sqrt{2}} \left( \int_x^{\frac{2}{x}} dy \right) dx = \int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1 \left( 2x - \frac{1}{x} \right) dx + \int_1^{\sqrt{2}} \left( \frac{2}{x} - x \right) dx = \\
 &= \left( x^2 - \ln |x| \right) \Big|_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1 + \left( 2 \ln |x| - \frac{1}{2} x^2 \right) \Big|_1^{\sqrt{2}} = 1 - \frac{1}{2} - \ln 1 + \ln \frac{1}{\sqrt{2}} + 2 \ln \sqrt{2} - 2 \ln 1 - 1 + \frac{1}{2} = \ln \sqrt{2}.
 \end{aligned}$$

### Zamiana zmiennych w całce podwójnej

Niech  $\overline{\Delta} \subseteq 0UV$ ,  $\overline{D} \subseteq 0XY$  – obszary domknięte w odpowiednich przestrzeniach oraz przekształcenie  $T: \overline{\Delta} \rightarrow \overline{D}$  takie, że  $T(u, v) = (x(u, v), y(u, v))$ .

Jeżeli funkcje  $x(u, v), y(u, v)$  mają ciągłe pochodne cząstkowe I rzędu w  $\overline{\Delta}$ , to

**Def. 4. Jakobianem** przekształcenia  $T$  nazywamy wyznacznik

$$J = \frac{D(x, y)}{D(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$$



**Tw. 5. (O zamianie zmiennych w całce podwójnej)** Jeżeli

1. funkcja  $f$  jest ciągła w  $\bar{D}$ ;
2. przekształcenie  $T$  jest różnowartościowe i przekształca wnętrze obszaru regularnego  $\bar{\Delta}$  na wnętrze obszaru regularnego  $\bar{D}$ ;
3. funkcje  $x(u, v), y(u, v)$  są klasy  $C^1$  (są ciągłe i mają ciągłe pochodne cząstkowe I rzędu) w pewnym obszarze zawierającym  $\bar{\Delta}$ ;
4. Jakobian  $\frac{D(x,y)}{D(u,v)}$  jest różny od zera we wnętrzu obszaru  $\bar{\Delta}$ ,

$$\text{to} \quad \iint_{\bar{D}} f(x, y) dx dy = \iint_{\bar{\Delta}} f(x(u, v), y(u, v)) \cdot \left| \frac{D(x, y)}{D(u, v)} \right| du dv.$$

**Przykład 6b.** Wykorzystując zamianę zmiennych, obliczyć pole obszaru  $\bar{D}$  ograniczonego krzywymi  $y = x$ ,  $y = 2x$ ,  $y = \frac{1}{x}$ ,  $y = \frac{2}{x}$  i zawierającego punkt  $(1, 1\frac{1}{2})$ .

Pole obliczymy jako całkę  $P = \iint_{\bar{D}} 1 dx dy$

Wprowadzamy nowe zmienne:  $u = xy$ ,  $v = \frac{y}{x}$ . Gdy  $(x, y) \in \bar{D}$ , wtedy  $(u, v) \in \bar{\Delta} = [1, 2] \times [1, 2]$ .

Odwzorowanie  $T : (u, v) \mapsto (x(u, v), y(u, v))$  ma wymagane własności.

$$x(u, v) = \sqrt{\frac{u}{v}}, \quad y(u, v) = \sqrt{uv}$$

$$x_u = \frac{\partial}{\partial u} \sqrt{\frac{u}{v}} = \frac{1}{2\sqrt{\frac{u}{v}}} \cdot \frac{1}{v} = \frac{1}{2\sqrt{uv}}, \quad x_v = \frac{\partial}{\partial v} \sqrt{\frac{u}{v}} = \frac{1}{2\sqrt{\frac{u}{v}}} \left(-\frac{u}{v^2}\right) = -\frac{1}{2} \sqrt{\frac{u}{v^3}},$$

$$y_u = \frac{\partial}{\partial u} \sqrt{uv} = \frac{1}{2\sqrt{uv}} \cdot v = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{v}{u}}, \quad y_v = \frac{\partial}{\partial v} \sqrt{uv} = \frac{1}{2\sqrt{uv}} \cdot u = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{u}{v}}.$$

Wyznaczamy Jakobian odwzorowania  $T$

$$J = \det \begin{bmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} \frac{1}{2\sqrt{uv}} & -\frac{1}{2}\sqrt{\frac{u}{v^3}} \\ \frac{1}{2}\sqrt{\frac{v}{u}} & \frac{1}{2}\sqrt{\frac{u}{v}} \end{bmatrix} = \frac{1}{4v} + \frac{1}{4v} = \frac{1}{2v}$$


Obliczamy całkę z wykorzystaniem opisanej zamiany zmiennych.

$$\begin{aligned} P &= \iint_{\bar{D}} 1 dx dy = \iint_{\bar{\Delta}} 1(u, v) \cdot J du dv = \int_1^2 \left( \int_1^2 \frac{1}{2v} dv \right) du = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \int_1^2 \frac{1}{v} dv \cdot \int_1^2 du = \frac{1}{2} \cdot \ln |v| \Big|_1^2 \cdot u \Big|_1^2 = \frac{1}{2} \ln 2 = \ln \sqrt{2}. \end{aligned}$$

## Współrzędne biegunowe

Częstą zamianą zmiennych w całce podwójnej jest zastąpienie zmiennych  $x, y$  zmiennymi  $r, \phi$ , gdzie


$$x = r \cos \phi, \quad y = r \sin \phi \quad \text{i jacobian} \quad J = \frac{D(x, y)}{D(r, \phi)} = \begin{vmatrix} \cos \phi & -r \sin \phi \\ \sin \phi & r \cos \phi \end{vmatrix} = r$$



Współrzędne biegunowe są używane przy obliczaniu całek po obszarach ograniczonych okręgami.

**Przykład 7.** Obliczyć objętość bryły ograniczonej powierzchniami:

$$x^2 + y^2 = 4, \quad z = 0, \quad 3x + 2y + z = 12.$$



Podstawą bryły jest koło  $\bar{D} = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 4\}$  na wysokości  $z = 0$ ,

z góry bryła jest ograniczona wykresem  $z = f(x, y) = 12 - 3x - 2y$ ,

dlatego objętość można obliczyć następująco:

$$V = \iint_{\bar{D}} f(x, y) dx dy = \iint_{\bar{D}} (12 - 3x - 2y) dx dy = \iint_{\bar{D}} 12 dx dy - \iint_{\bar{D}} (3x + 2y) dx dy$$

$$\iint_{\bar{D}} 12 dx dy = 12 \iint_{\bar{D}} dx dy = 12 \cdot \text{pole } \bar{D} = 12 \cdot \pi \cdot 2^2 = 48\pi.$$

Do obliczenia całki  $\iint_{\bar{D}} (3x + 2y) dx dy$  wykorzystamy współrzędne biegunowe  $r, \phi$ , gdzie,

$$x = r \cos \phi, \quad y = r \sin \phi, \quad J = r, \quad r \in [0, 2], \quad \phi \in [0, 2\pi].$$

$$\iint_{\bar{D}} (3x + 2y) dx dy = \int_0^{2\pi} \left( \int_0^2 (3r \cos \phi + 2r \sin \phi) r dr \right) d\phi = \int_0^{2\pi} (3 \cos \phi + 2 \sin \phi) d\phi \cdot \int_0^2 r^2 dr = 0.$$


Ostatecznie objętość  $V = 48\pi$ .

**Uwaga:** Do obliczania całek po obszarach ograniczonych elipsą:  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

wygodna może być następująca zamiana zmiennych:

$x, y$  zastępujemy zmiennymi  $r, \phi$ , gdzie

$$x = ar \cos \phi, \quad y = br \sin \phi \quad \text{i jacobian} \quad \frac{D(x, y)}{D(r, \phi)} = \begin{vmatrix} a \cos \phi & -ar \sin \phi \\ b \sin \phi & br \cos \phi \end{vmatrix} = abr$$



Dla pełnej elipsy przyjmujemy ograniczenia współrzędnych:  $r \in [0, 1], \phi \in [0, 2\pi]$ .

**Przykład 8.** Obliczyć pole powierzchni  $\bar{E}$  ograniczonej elipsą:  $9x^2 + 4y^2 = 36$ .


$$9x^2 + 4y^2 = 36 \Leftrightarrow \frac{x^2}{2^2} + \frac{y^2}{3^2} = 1 \quad \text{Półosie elipsy to } a = 2, \quad b = 3.$$

Pole elipsy obliczymy jako całkę  $P = \iint_{\bar{E}} dx dy$  z wykorzystaniem następującej zamiany zmiennych:

$$x = 2r \cos \phi, \quad y = 3r \sin \phi, \quad J = 2 \cdot 3 \cdot r, \quad r \in [0, 1], \quad \phi \in [0, 2\pi]$$

$$P = \iint_{\bar{E}} dx dy = \int_0^{2\pi} \left( \int_0^1 6r dr \right) d\phi = \int_0^{2\pi} d\phi \cdot \int_0^1 6r dr = 2\pi \cdot \frac{6r^2}{2} \Big|_0^1 = 6\pi.$$

**Przykład 9.** Obliczyć objętość bryły ograniczonej powierzchniami:  $x^2 + y^2 = a^2$ ,  $y^2 + z^2 = a^2$ , gdzie  $a$  jest pewną liczbą dodatnią.



Bryła ma między innymi następujące płaszczyzny symetrii:  $z = 0$ ,  $y = 0$ ,  $x = 0$ .

Dlatego jej objętość można obliczyć jako 8 razy objętość tej części bryły, która zawiera się w oktancie nieujemnych współrzędnych.

Jeśli  $y^2 + z^2 \leq a^2$  to dla  $z \geq 0$  będzie  $0 \leq z \leq \sqrt{a^2 - y^2}$ .

Jako  $D$  przyjmijmy odpowiednią ćwiartkę koła:

$$\bar{D} = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq a^2, x \geq 0, y \geq 0\} = \{(x, y) : y \in [0, a], 0 \leq x \leq \sqrt{a^2 - y^2}\}.$$

$$\begin{aligned} V &= 8 \cdot \iint_{\bar{D}} \sqrt{a^2 - y^2} dx dy = 8 \cdot \int_0^a \left( \int_0^{\sqrt{a^2 - y^2}} \sqrt{a^2 - y^2} dx \right) dy = 8 \cdot \int_0^a \sqrt{a^2 - y^2} \left( \int_0^{\sqrt{a^2 - y^2}} dx \right) dy = \\ &= 8 \cdot \int_0^a \sqrt{a^2 - y^2} \cdot \sqrt{a^2 - y^2} dy = 8 \cdot \int_0^a (a^2 - y^2) dy = 8 \cdot \left( a^2 y - \frac{1}{3} y^3 \right) \Big|_0^a = 8 \left( a^3 - \frac{1}{3} a^3 \right) = \frac{16}{3} a^3. \end{aligned}$$

### Zastosowanie w fizyce

Jeśli  $\rho(x, y)$  jest gęstością powierzchniową masy obszaru regularnego  $\bar{D}$ ,

to całka  $M = \iint_{\bar{D}} \rho(x, y) dx dy$  wyraża masę tego obszaru.

$$\text{Całki } M_X = \iint_{\bar{D}} y \rho(x, y) dx dy \text{ i } M_Y = \iint_{\bar{D}} x \rho(x, y) dx dy$$

przedstawiają momenty statyczne obszaru  $\bar{D}$ :  $M_X$  – względem osi OX,  $M_Y$  – względem osi OY.


Współrzędne środka masy obszaru  $\bar{D}$  o gęstości  $\rho(x, y)$  wyrażają się następująco:

$$(x_C, y_C) = \left( \frac{M_y}{M}, \frac{M_x}{M} \right).$$

Całki  $B_X = \iint_{\bar{D}} y^2 \rho(x, y) dx dy$  i  $B_Y = \iint_{\bar{D}} x^2 \rho(x, y) dx dy$  oraz  $B_Z = \iint_{\bar{D}} (x^2 + y^2) \rho(x, y) dx dy$  wyrażają momenty bezwładności obszaru  $\bar{D}$ :

$B_X$  – względem osi OX,  $B_Y$  – względem osi OY,  $B_Z$  – względem osi OZ.

**Przykład 10.** Wyznaczyć środek ciężkości jednorodnego trójkąta  $\bar{T}$  o wierzchołkach  $A = (0, 0)$ ,  $B = (a, 0)$ ,  $C = (a, a)$ , gdzie  $a$  jest pewną liczbą dodatnią.



Przyjmujemy, że  $\rho(x, y) = c$  – stała gęstość powierzchniowa.

Wtedy masa trójkąta to

$$M = \iint_{\bar{T}} \rho(x, y) dx dy = \iint_{\bar{T}} c dx dy = c \cdot \iint_{\bar{T}} dx dy = c \cdot (\text{pole } T) = c \cdot \frac{a^2}{2}.$$

Współrzędne środka masy trójkąta to  $(x_C, y_C)$ , gdzie  $x_C = \frac{\iint_{\bar{T}} x c dx dy}{M}$ ,  $y_C = \frac{\iint_{\bar{T}} y c dx dy}{M}$ .

$$\iint_{\bar{T}} x c dx dy = c \cdot \iint_{\bar{T}} x dx dy = c \cdot \int_0^a \left( \int_0^x x dy \right) dx = c \cdot \int_0^a \left( xy \Big|_{y=0}^{y=x} \right) dx = c \cdot \int_0^a x^2 dx = c \cdot \frac{a^3}{3}.$$

$$\text{Stąd } x_C = \left( c \cdot \frac{a^3}{3} \right) / \left( c \cdot \frac{a^2}{2} \right) = \frac{2}{3} a.$$

$$\iint_{\bar{T}} y c dx dy = c \cdot \iint_{\bar{T}} y dx dy = c \cdot \int_0^a \left( \int_0^x y dy \right) dx = c \cdot \int_0^a \left( \frac{y^2}{2} \Big|_{y=0}^{y=x} \right) dx = c \cdot \int_0^a \frac{x^2}{2} dx = c \cdot \frac{a^3}{6}.$$

$$\text{Stąd } y_C = \left( c \cdot \frac{a^3}{6} \right) / \left( c \cdot \frac{a^2}{2} \right) = \frac{a}{3}.$$